

口腔洗浄・含嗽剤



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ベンゼトニウム塩化物 うがい液0.2%「KYS」

Benzethonium Chloride Gargle liquid 0.2%「KYS」

ベンゼトニウム塩化物製剤

略称

BCガーグル

※ 診療報酬請求時は上記の
販売名(和名)をご記載
ください。

保険適用



矯味剤に
キシリトールを使用!
使いやすい
メジャーカップ付き!



製品説明
動画はこちら



請求点数(院内投薬)

薬剤料	17点(40mL 1本)
調剤料	8点(処方1回につき)
処方料	42点(処方1回につき)
薬剤情報提供料	10点(月1回)
合計	77点

うがい薬のみの 投薬について

本製剤のみの投薬は可能です。

平成26年度の診療報酬改定において、入院中以外の患者に対する治療を目的としないうがい薬のみの投薬は算定できなくなりましたが、本製剤は**対象外**です。

〈参考〉平成26年3月31日 厚生労働省保険局医療課事務連絡
疑義解釈資料 医科診療報酬点数表関係 問74

効能・効果



口腔内の消毒

■ 投薬の対象例

歯肉炎、口腔創傷、膿瘍切開、歯周外科治療時の口腔内消毒、その他外科的処置後の口腔内消毒など*



抜歯創の感染予防

■ 投薬の対象例

抜歯後の口腔内消毒*

*保険については各都道府県により判断が異なることがあります。

使用方法

①



口腔内の消毒の場合

1本(40mL) 5日分*

本剤 **2mL** を
メジャーカップで
はかってください。



*1日4回、毎食後および寝る前に
うがい・洗口する場合

①



抜歯創の感染予防の場合

1本(40mL) 1~2日分*

本剤 **5~10mL** を
メジャーカップで
はかってください。




*1日4回、毎食後および寝る前に
うがい・洗口する場合

②



① をコップに
うつして
ください。

③



コップに
水またはぬるま湯
(約100mL) を
入れて希釈
してください。

④



数回に分けて
うがいして
ください。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等は裏面のDIをご参照ください。

口腔洗浄・含嗽剤

薬価基準収載

日本標準商品分類番号	87279
承認番号	21800AMZ10294000
薬価基準収載年月	2006年 7月
販売開始年月	2006年10月

貯 法：室温保存
使用期限：3年(外箱に表示)

ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」

ベンゼトニウム塩化物製剤

組成・性状

有効成分 (100g中)	ベンゼトニウム塩化物 0.2g
添加物	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ポリソルベート80、キシリトール、ハッカ油、L-メントール、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、チモール、銅クロロフィリンナトリウム、香料
性状	緑色～濃緑色の液で、芳香がある。 振ると強く泡立つ。

効能又は効果

口腔内の消毒、抜歯創の感染予防

用法及び用量

口腔内の消毒には、ベンゼトニウム塩化物として、0.004% (50倍希釈) 溶液として洗口する。
抜歯創の感染予防には、ベンゼトニウム塩化物として、0.01%～0.02% (10倍～20倍希釈) 溶液として、洗浄する。

使用上の注意

- 1. 重要な基本的注意**
過敏症状があらわれた場合には投与を中止すること。
- 2. 副作用**
その他の副作用
(1) 過敏症
過敏症があらわれることがある。
(2) その他
ときに(0.1%～5%) 刺激感があらわれることがある。
- 3. 適用上の注意**
(1) 洗口の場合
① 用時希釈して使用させること。
② 含嗽用에만使用させること。
③ 抜歯後等の口腔創傷の場合、血餅の形成が阻害されると思われる時期には、はげしい洗口を避けさせること。
(2) 洗浄の場合
① 用時希釈して使用すること。
② 洗浄用에만使用すること。

薬効薬理

- ベンゼトニウム塩化物は、芽胞のない細菌、真菌類に広く抗菌力を持ち、グラム陽性菌には陰性菌より低濃度で効果を示す。
- 生物学的同定性
円筒平板法による阻止円を指標とした抗菌作用
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」の10倍希釈液及び50倍希釈液は、次の菌種について試験したとき、明確な阻止円が形成され、有意な抗菌作用を示した。また、標準製剤との効力比較の結果、両製剤間に有意差は認められず、両製剤の生物学的同定性が確認された。なお、参考として生理食塩水、試験製剤基剤(ベンゼトニウム塩化物が含有されていないもの)についても同様の操作を実施したが、阻止円は認められなかった。

① <i>Staphylococcus aureus</i>	50倍希釈	10倍希釈
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」	10.10±1.08mm	11.39±0.77mm
標準製剤	9.66±0.63mm	11.12±0.27mm
② <i>Bacillus subtilis</i>	50倍希釈	10倍希釈
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」	10.26±0.68mm	12.58±0.50mm
標準製剤	10.48±0.33mm	13.31±1.25mm
③ <i>Escherichia coli</i>	50倍希釈	10倍希釈
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」	9.93±0.73mm	11.13±0.90mm
標準製剤	9.91±0.74mm	11.07±0.83mm
④ <i>Candida albicans</i>	50倍希釈	10倍希釈
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」	阻止円は認められなかった	13.42±0.78mm
標準製剤	阻止円は認められなかった	13.14±1.41mm

取扱い上の注意

- 直射日光を避け、室温で保管すること。
- 安定性試験
最終包装品を用いた長期保存試験(25℃±2℃、60%RH±5%、36ヶ月)の結果、本製剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

包装

40mL×30(本)

詳細は電子化された添付文書をご参照ください。添付文書の改訂にご留意ください。
2022年4月改訂(第6版) 添付文書より作成



包装 ● 1 函：30本〔1本40mL、患者様向け使用説明書〕

患者様向け
使用説明書

表：口腔内の消毒の場合



裏：抜歯創の感染予防の場合



※掲載情報は2023年4月現在のものです。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー 昭和薬品**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎ **0120-416480**
受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store
Google Play
どちらでもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



QA013X2303